Salbutamol pour inhalation inhalateur doseur BP

LOXAIR

Inhalateur doseur

100 MICROGRAMMES par dose

200 DOSES

Notice : information de l'utilisateur

Avant d'utiliser l'inhalateur doseur, veuillez lire attentivement cette notice et respecter les instructions

nyd pharma

Description de l'inhalateur



Test de l'inhalateur

Avant la première utilisation de l'inhalateur, ou s'il n'a pas été utilisé depuis au moins deux jours, libérez une bouffée dans l'air.



MODE D'EMPLOI DE L'INHALATEUR

Utilisation de l'inhalateur

1 Retirez le capuchon protecteur et assurez-vous que l'embout buccal est propre.

2 Agitez bien l'inhalateur avant chaque utilisation.

3 Tenez l'inhalateur verticalement comme sur l'illustration, en plaçant le pouce au-dessous.
Placez un ou deux doigts sur le dessus de la cartouche.
Expirez doucement par la bouche.
Introduisez ensuite l'embout buccal de l'inhalateur dans la bouche, entre les dents, et refermez les lèvres autour de cet embout (ne le mordez pas).

4 Penchez la tête légèrement vers l'arrière. Commencez une lente inspiration par la bouche. Pendant l'inspiration, pressez sur la cartouche pour libérer une dose de médicament, tout en continuant à inspirer profondément et régulièrement.



5 Sortez l'inhalateur de la bouche et bloquez votre respiration pendant 10 secondes, ou aussi longtemps que vous le pouvez sans difficulté. Expirez lentement.

6 Si une nouvelle dose est nécessaire, attendez au moins une minute et répétez les étapes 2 à 5. Après utilisation, remettez le capuchon protecteur en place.



IMPORTANT

Prenez votre temps pour les étapes 4 et 5.

Il est important que vous commenciez à inspirer aussi lentement que possible juste avant de libérer la dose.

Les premières fois, contrôlez votre technique dans un miroir. Si vous voyez de fines gouttelettes s'échapper du haut de l'inhalateur ou des côtés de la bouche, recommencez à l'étape 2. Cela indique que la technique employée n'est pas la bonne.

NETTOYAGE

Nettoyez l'inhalateur au moins une fois par semaine.

1. **Tirez délicatement la cartouche métallique hors du corps en plastique de l'inhalateur. Retirez le capuchon protecteur.**
2. **Rincez le corps en plastique et le capuchon protecteur à l'eau du robinet.**
3. **Secouez bien pour éliminer l'eau en excès et laissez sécher. N'utilisez pas de source de chaleur.**
4. **Remettez la cartouche et le capuchon protecteur en place.**

UTILISATION PAR DES ENFANTS

Si nécessaire, les parents devront aider leur enfant, afin de garantir une utilisation correcte de l'inhalateur.

Salbutamol pour inhalation inhalateur doseur BP

LOXAIR

inhalateur doseur 100 µg/dose

SANS CFC

COMPOSITION

Sulfate de salbutamol BP équivalent à salbutamol....100 µg par déclenchement en suspension dans propulseur HFA – 134 a.....q.s.

INDICATIONS

- Traitement de la crise d'asthme
- Traitement et prophylaxie du bronchospasme dans l'asthme bronchique, la bronchite chronique et l'emphysème
- Prévention des symptômes dans des circonstances connues par le patient pour précipiter une crise d'asthme (par exemple, avant l'effort).

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'un quelconque des constituants de la préparation.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Adultes

- **Soulagement des épisodes aigus de bronchospasme :** 1 ou 2 bouffées. Cette dose est généralement suffisante. Si les symptômes persistent, renouveler l'administration à la même dose au bout de quelques minutes.
- **Prévention du bronchospasme induit par l'effort :** 2 inhalations 15 à 30 minutes avant l'effort.
- **Traitement chronique d'entretien ou prophylaxie :** 1 ou 2 inhalations, 3 ou 4 fois par jour.

Enfants

(âgés de moins de 12 ans)

- **Bronchospasme aigu :** 1 inhalation, une seule fois
- **Traitement chronique d'entretien ou prophylaxie :** 1 inhalation, 3 ou 4 fois par jour.

La dose quotidienne ne doit pas dépasser 15 bouffées.

Respectez la prescription de votre médecin. Si la dose recommandée ne procure pas l'effet souhaité ou si les symptômes s'aggravent, consultez votre médecin.

ATTENTION

- En cas d'administration après une crise d'asthme, consultez immédiatement votre médecin si vous ne constatez aucune amélioration au bout de quelques minutes.
- Chez les patients asthmatiques adultes, l'administration continue d'un médicament anti-inflammatoire est recommandée si la fréquence d'inhalation de salbutamol est supérieure à une fois par semaine.
- Ne pas dépasser la dose prescrite.
- La cartouche métallique est sous pression. Ne la percez pas et ne la jetez pas au feu, même lorsqu'elle est vide.
- Tenir à distance des yeux.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Le salbutamol peut induire une réponse positive aux contrôles anti-dopage.

GROSSESSE

L'administration de ce médicament pendant la grossesse n'est pas contre-indiquée.

ALLAITEMENT

Le salbutamol est sécrété dans le lait maternel ; par conséquent, son utilisation n'est pas recommandée chez les femmes qui allaitent.

EFFETS INDÉSIRABLES

Rares : tremblements légers, palpitations, maux de tête, crampes musculaires et tachycardie. Comme avec d'autres agents inhalés, un bronchospasme paradoxal peut survenir ; l'administration sera alors interrompue et une autre forme de traitement devra être prescrite.

CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

PRÉSENTATION

Aérosol pour inhalation.
Cartouche de 200 doses.

Exploitant :
NYD PHARMA (agréé Swissmedic)
2 place du Port
1204 Genève - SUISSE
www.nydpharma.com
Fabricant : CIPLA Ltd.

Date de révision de la notice :
Janvier 2013

25/02/14